

Bristolskalan över Avföringsformer

TYP 1 Separata hårda klumpar som liknar nötter	
TYP 2 Korvformad med klumpar	
TYP 3 Liknar en korv med sprickor på utsidan	
TYP 4 Liknar en korv, smidig och mjuk	
TYP 5 Mjuka klumpar med skarpa kanter (lätta att få ut)	
TYP 6 Småbitar	
TYP 7 Vattnig utan klumpar Enbart vätska	

MOVICOL®
Junior Neutral
makrogol 3350 med elektrolyter

ÖKA
MOVICOL®
DOSEN

ÖKA
MOVICOL®
DOSEN

ÖKA
MOVICOL®
DOSEN

BIBEHÅLL
MOVICOL®
DOSEN ✓

BIBEHÅLL
MOVICOL®
DOSEN ✓

MINSKA
MOVICOL®
DOSEN

MINSKA
MOVICOL®
DOSEN

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.

Mjukstartar hårda magar



Namn: _____

Ålder: _____

Vikt: _____

Nästa besök

Datum	Tid

Läs alltid bipacksedeln noga före användning.

MOVICOL® Junior Neutral, pulver till oral lösning i dospåse. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. **Indikation:** För behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år och för upplösning av fekalom hos barn från 5 år. Fekalom definieras som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. **Dosering:** Normal startdos: Barn 2–6 år: 1 dospåse dagligen. Barn 7–11 år: 2 dospåsar dagligen. Dosen skall justeras individuellt upp eller ner. Maxdosen överstiger normalt inte 4 dospåsar per dag. Varje dospåse löses upp i ett kvarts glas (ca. 62,5 ml) vatten. **Fekalom:** En behandlingskur vid fekalom pågår upp till 7 dagar. Dag 1: 4 dospåsar, Dag 2: 6 dospåsar, Dag 3: 8 dospåsar, Dag 4: 10 dospåsar, Dag 5: 12 dospåsar, Dag 6: 12 dospåsar, Dag 7: 12 dospåsar. Det dagliga antalet dospåsar ska intas vid skilda tillfällen. Vid behandling av fekalom kan till exempel en dagsdos på 12 påsar lösas upp i 750 ml vatten. Alla doserna ska intas inom 12 timmar. Dosering enligt ovan ska avslutas så snart fekalomet lösts upp. **Kontraindikationer:** Använd inte MOVICOL vid tarmpårening/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. **Varningar och försiktighet:** Vätskan i MOVICOL® Junior Neutral efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL® Junior Neutral. **Interaktioner:** Oral medicinering skall undvikas inom en timme före och efter administrering av stora mängder av MOVICOL® Junior Neutral. **De vanligaste biverkningarna:** Buksmärta, borborygmi, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, anorektalt obehag, bukdistension, gasbildning. För mer information se www.fass.se. Kontakt: Norgine Sverige AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73, Solna. Översyn av produktresumén: 20190416. SE-GE-MOV-2000004 MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.



MOVICOL®
Junior Neutral
makrogol 3350 med elektrolyter

Avföringsschema

Vecka 1	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

Vecka 2	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

* Se Bristolskala på baksidan.

Ev. anmärkningar:

Vecka 3	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

Vecka 4	Antal påsar	Antal avföringar	Avföringstyp*)	Notering
Mån				
Tis				
Ons				
Tors				
Fre				
Lör				
Sön				

* Se Bristolskala på baksidan.

Ev. anmärkningar:
